

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ICC είναι υγρό και όξινης αντίδρασης σκευάσμα συμπυκνωμένου πενταένυδρου θειικού χαλκού ο οποίος βρίσκεται σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή.

Η καινοτόμος τεχνολογία του επιτρέπει στα ιόντα χαλκού να παραμένουν βιοενεργά μέχρι πλήρους απορροφάσεως από τους φυτικούς ιστούς.

Η βελτίωση της διεσοδικής ικανότητας των ιόντων χαλκού στους φυτικούς ιστούς έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτούμενες δόσεις να είναι μειωμένες σε σχέση με τις άλλες παραδοσιακές μορφές χαλκούχων σκευασμάτων με συνέπεια την μείωση της τοξικότητας του και την δυνατότητα εφαρμογής του ακόμη και σε ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης του φυτού.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αρκεί να μη γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΤΟ ICC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 889/08

Αποτρέπει την συσσώρευση αλάτων σε αλατούχα εδάφη με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών.

Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργοποίηση της απορρόφησης και άλλων ιχνοστοιχείων.

Ενισχύει την δραστικότητα των αμυντικών μηχανισμών του φυτού.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος (διαφυλλικά), με καθολική και ομοιόμορφη διαβροχή έως απορροής. Δημιουργεί ομοιογενές (χωρίς συσσωματώματα) και σταθερό υδατικό διάλυμα. Δε λερώνει - βάφει τα φυτά που ψεκάζονται.

Η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται μετά από συμβουλή γεωπόνου.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Το ICC εφαρμόζεται προληπτικά ή θεραπευτικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων σε όλες τις καλλιέργειες όπως κηπευτικά, φράουλες, πατάτα, ψυχανθή, αροτριάδες καλλιέργειες, οπωροφόρα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, ροδιές, καλλωπιστικά, χλοοτάπητες και άλλες.

ICC®	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ*
ΜΙΚΡΕΣ	0,2 - 0,3 L ανά στρέμμα	50 - 150 cc ανά 100 L εως 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητικό κύκλο
ΜΕΤΡΙΕΣ	0,3 - 0,4 L ανά στρέμμα	
ΜΕΓΑΛΕΣ	0,4 - 0,8 L ανά στρέμμα	

* Ελάχιστη ποσότητα νερού διάλυσης 60 L/στρ. στα λαχανικά και 100-150L/στρ. στα οπωροφόρα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται / αναμιγνύεται με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα, όχι όμως με ορυκτέλαια ή με σκευάσματα που έχουν πολύ χαμηλό pH.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε κλειστή αποθήκη, προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία και σε θερμοκρασίες άνω των 0°C.



ICC®
Ionic Copper Concentrate

ΘΡΕΨΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ


1L

Λίπασμα Χαλκού

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ β/ο:

Ιοντικός Χαλκός (Cu⁺⁺) 5,2%
ως Πενταένυδρος Θειικός Χαλκός
Σύνθετος παράγοντας
αδρανήs διαλύτης: 94,8%

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
CuSO₄·5H₂O



Λίπασμα ΕΚ

Αντιπρόσωπος: AgroCu^{re}

www.agrocure.com



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παρασκευάζεται από την ENVIRO SAFE SOLUTIONS Sdn Bhd.

Η ENVIRO SAFE SOLUTIONS Sdn Bhd εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση του. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέριση στο περιβάλλον.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΛ 210-7793777/ γιατρό. Περιέχει: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ.



H314

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.



H410

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.