

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ICC είναι υγρό και όξινης αντίδρασης σκεύασμα συμπυκνωμένου χαλκού ο οποίος βρίσκεται σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή, υψηλής απορροφησιμότητας.

Η καινοτόμος τεχνολογία του ICC επιτρέπει στα ιόντα χαλκού να παραμένουν βιοενεργά μέχρι πλήρους απορρόφησής τους από τους φυτικούς ιστούς.

Η μεγάλη διεισδυτική ικανότητα των ιόντων χαλκού στους φυτικούς ιστούς έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτούμενες δόσεις του ICC να είναι μικρές σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μορφές χαλκούχων σκευασμάτων με συνέπεια τη μείωση της τοξικότητας του ICC και τη δυνατότητα εφαρμογής του ακόμη και σε ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης του φυτού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Το ICC ενισχύει τη δραστηριότητα των αμυντικών μηχανισμών του φυτού. Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος (διαφυλλικά), με καθολική και ομοιόμορφη διαβροχή έως απορροής. Δημιουργεί ομοιογενές (χωρίς συσσωματώματα) και σταθερό υδατικό διάλυμα. Δε λερώνει και δε βάφει τα φυτά που ψεκάζονται. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και μέσω του εδάφους με υδρολίπανση. Η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται μετά από συμπουλή γεωπόνου.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αρκεί να μη γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΤΟ ICC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 889/08

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

- Το ICC εφαρμόζεται προληπτικά ή θεραπευτικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων σε όλες τις καλλιέργειες όπως κηπευτικά, φράουλες, πατάτα, ψυχανθή, αροτριαιές καλλιέργειες, σπυροφόρα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, ροδιές, καλλωπιστικά, χλοοτάπητες και άλλες.


ICC®	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ*
ΜΙΚΡΕΣ	0,2-0,3L ανά στρέμμα	50-150cc ανά 100L έως 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητικό κύκλο
ΜΕΤΡΙΕΣ	0,3-0,4L ανά στρέμμα	
ΜΕΓΑΛΕΣ	0,4-0,8L ανά στρέμμα	

* Ελάχιστη ποσότητα νερού διάλυσης 60L/στρ. στα λαχανικά και 100-150L/στρ. στα σπυροφόρα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Συνδυάζεται με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα θρέψης και φυτοπροστασίας. Θα πρέπει να γίνεται μικρή κλίμακα δοκιμή/ανάμιξη με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο για το ενδεχόμενο σχηματισμού ιζηματος.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΑΛΚΟΥ



1L

ICC®
IONIC COPPER CONCENTRATE

Θρέψη - Ενίσχυση της άμυνας των φυτών

Λίπασμα ΕΚ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ	Β/ο	Β/Β
Υδατοδιαλυτός Ιοντικός Χαλκός (Cu ⁺⁺).....	5,85%	5,04%
Υδατοδιαλυτό Θείο (SO ₃).....	9,49%	8,18%

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες άνω των -4°C, σε κλειστή αποθήκη, προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παρασκευάζεται στο 80° χλμ. εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, Υπατο Βοιωτίας.

Η AGROCURE (τηλ. 2310 797.262 • email: info@agrocure.com) εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση του. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν τη χρήση του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102: Μακριά από παιδιά.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσσο ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: **ΘΕΙΙΚΟ ΧΑΛΚΟ**

UFI: 3300-R0XR-W008-GDEK



H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.



H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

AGROCURE • ΒΙΠΕ Σίνδου ΟΤ 53Β • τ.κ. 57022
τηλ.: 2310 797.262 • email: info@agrocure.com

Αντιπρόσωπος

AgroC^ure

www.agrocure.com