



ICI[®]
Ionic Concentrated Iron 

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ



Κάνε κίνηση Ματ...

παίξε με ICI[®] 

Agro  re

Υγρό Λίπασμα Σιδήρου

Κάνε την κίνηση Ματ...

με ICI®

ICI®

Ionic Concentrated Iron



Το ICI είναι **υγρός, συμπυκνωμένος επταένυδρος θειικός σίδηρος** ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$), σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή **μεγάλης αποτελεσματικότητας**, κατά της τροφοπενίας (έλλειψης) σιδήρου στα φυτά. Περιέχει 57gr στοιχειακό σίδηρο και 33gr στοιχειακό θείο ανά 1L σε μορφές πλήρως διαλυτές και αφομοιώσιμες από τα φυτά.

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ICI παράγεται με καινοτόμο τεχνολογία που **επιτυγχάνει τη δημιουργία ενεργών ιόντων σιδήρου** συμπλοκοποιημένων με δίπολα μορίου νερού. Τα ιόντα αυτά **διεισδύουν και διαχέονται γρήγορα και ανεμπόδιστα στους φυτικούς ιστούς** διαπερνώντας εύκολα τις κυτταρικές μεμβράνες και παρέχοντας αποτελεσματικά και άμεσα σίδηρο στα φυτά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Προληπτική δράση. Όταν ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες την άνοιξη η νεαρή βλάστηση αυξάνεται ταχύτατα και ο «δυσκίνητος» σίδηρος δε φτάνει εύκολα στα νέα φύλλα, ειδικά σε περιπτώσεις έλλειψης ή μικρής διαθεσιμότητάς του στο έδαφος. Έτσι τα νέα αναπτυσσόμενα φύλλα μένουν χλωρωτικά χωρίς έντονο πράσινο χρώμα, αφού δε μπορούν να παράγουν αρκετή χλωροφύλλη. Με τον ψεκασμό ICI απευθείας στα φύλλα, αυτά προσλαμβάνουν άμεσα και αποτελεσματικά σίδηρο, διατηρούνται βαθυπράσινα και δε σταματούν να παράγουν χλωροφύλλη.

Θεραπευτική δράση. Αν έχουν ήδη εκδηλωθεί συμπτώματα της τροφοπενίας σιδήρου, τα φύλλα που θα σχηματιστούν αμέσως μετά τη διαφυλλική εφαρμογή του ICI δε θα είναι χλωρωτικά, αφού οι βλαστοί και οι καταβολές των φύλλων θα τροφοδοτηθούν αποτελεσματικά με σίδηρο.

Χάρη στη **μεγάλη διεισδυτική ικανότητα** του ICI στους φυτικούς ιστούς, η περιεκτικότητα των φύλλων σε ιόντα σιδήρου αυξάνεται άμεσα και σημαντικά, **χωρίς να απαιτούνται μεγάλες δόσεις εφαρμογής**. Συνεπώς τα φυτά παράγουν επαρκή χλωροφύλλη, φωτοσυνθέτουν και αναπτύσσονται έντονα επιτυγχάνοντας τελικά **υψηλές αποδόσεις παραγωγής**.

Σε διαφυλλικές εφαρμογές, το ICI **δε «λερώνει»** τα φυτά και τα φυτικά όργανα που ψεκάζονται, ενώ σε περίπτωση χρήσης μέσω εδάφους **καθαρίζει** το σύστημα στάγδην άρδευσης από άλατα.

“

Σκεύασμα υγρό, όξινο και πλήρως υδατοδιαλυτό, άρα **εύκολο στη διάλυση και τη συνδυαστικότητα**, αλλά και γρήγορα απορροφήσιμο από τα φυτά.

Σχηματίζει **ομοιογενές και σταθερό υδατικό διάλυμα** χωρίς συσσωματώματα και ιζήματα, το οποίο εφαρμόζεται διαφυλλικά & με στάγδην άρδευση. Το ICI κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο του διαλύματος και δεν υπάρχουν κίνδυνοι εμφράξεων των μπεκ (ακροφυσίων).

”

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICI ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ & ΡΟΔΙΑ

Ενδεικτικές δόσεις: 150 έως 200 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της κάθε καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 80 έως 130 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού, του σταδίου ανάπτυξης, του συστήματος διαμόρφωσης και της ηλικίας της καλλιέργειας.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Ενδεικτικές δόσεις: 150 έως 200 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 100 έως 150 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού, του σταδίου ανάπτυξης, του συστήματος διαμόρφωσης και της ηλικίας της καλλιέργειας.

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ & ΑΚΡΟΔΡΥΑ

Ενδεικτικές δόσεις: 150 έως 200 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 100 έως 150 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού, του σταδίου ανάπτυξης, του συστήματος διαμόρφωσης και της ηλικίας της καλλιέργειας.

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Ενδεικτικές δόσεις: 150 έως 200 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 100 έως 200 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού, του σταδίου ανάπτυξης, του συστήματος διαμόρφωσης και της ηλικίας της καλλιέργειας.

ΠΑΤΑΤΑ & ΦΡΑΟΥΛΑ

Ενδεικτικές δόσεις: 100 έως 150 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 30 έως 70 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας.

ΣΟΛΑΝΩΔΗ & ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ

Ενδεικτικές δόσεις: 100 έως 150 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 40 έως 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ

Ενδεικτικές δόσεις: 100 έως 150 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών της καλλιέργειας

Ενδεικτικός όγκος ψεκασμού: 30 έως 80 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα αναλόγως του ψεκαστικού εξοπλισμού και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας

ΤΟ ICI ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΕ 834/07 ΚΑΙ 889/08



“
Νέα
καινοτόμος
τεχνολογία
ιόντων
σιδήρου
”



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το ICI μπορεί να εφαρμοστεί σε ΟΛΕΣ τις καλλιέργειες, ψεκαζόμενο στο φύλλωμα (διαφυλλικά), προληπτικά ή θεραπευτικά, κατά την βλαστική ανάπτυξη.

Δόσεις: 100 έως 200 ml ICI ανά 100 λίτρα νερού σε κάθε ψεκασμό, αναλόγως των αναγκών κάθε καλλιέργειας και κάθε περιοχής. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εφαρμογών αλλά καλό είναι οι εφαρμογές να ξεκινήσουν με την έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης και να επαναλαμβάνονται σε τακτικά διαστήματα 2-3 εβδομάδων αναλόγως των απαιτήσεων της κάθε καλλιέργειας σε συνδυασμό με την περιεκτικότητα και διαθεσιμότητα του εδάφους σε σίδηρο. Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων. Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα εφαρμοζόμενο στις συνιστώμενες δόσεις.

Επίσης, **το ICI μπορεί να εφαρμοστεί και στο έδαφος** μέσω στάγδην άρδευσης σε δόσεις από 200 έως 400 ml ανά στρέμμα ανάλογα με το είδος, το στάδιο και τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων εφαρμογών μέσω του εδάφους, οι δόσεις μπορούν να μειωθούν στα 100-200 ml ανά στρέμμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το ICI είναι ένα όξινο σκεύασμα και συνδυάζεται πολύ καλά με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση συνδυασμού με άλλα σκευάσματα, συνιστάται να γίνεται πρώτα δοκιμή ανάμιξης σε μικρή κλίμακα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε κλειστή αποθήκη, προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία και σε θερμοκρασίες άνω των 0°C.

“


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ...

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ


”

ΝΕΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΙΟΝΤΩΝ

 www.agrocure.com

 info@agrocure.com

 Agrocure

 2310 797262

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210- 7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΟΝΤΩΝ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Agro Cu re

Σίνδος ΟΤ 53Β - Θεσσαλονίκη