

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ICC είναι υγρό και όξινης αντίδρασης σκεύασμα συμπυκνωμένου χαλκού ο οποίος βρίσκεται σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή, υψηλής απορροφησιμότητας.

Η καινοτόμος τεχνολογία του ICC επιτρέπει στα ιόντα χαλκού να παραμένουν βιο-ενεργά μέχρι πλήρους απορρόφησής τους από τους φυτικούς ιστούς.

Η μεγάλη διεισδυτική ικανότητα των ιόντων χαλκού στους φυτικούς ιστούς έχει ως αποτέλεσμα οι απαιτούμενες δόσεις του ICC να είναι μικρές σε σχέση με άλλες παραδοσιακές μορφές χαλκούχων σκευασμάτων με συνέπεια τη μείωση της τοξικότητας του ICC και τη δυνατότητα εφαρμογής του ακόμη και σε ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης του φυτού κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

Το ICC ενισχύει τη δραστηριότητα των αμυντικών μηχανισμών του φυτού. Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος (διαφυλλικά), με καθολική και ομοιόμορφη διαβροχή έως απορρόφηση. Δημιουργεί ομοιογενές (χωρίς συσσωματώματα) και σταθερό υδατικό διάλυμα. Δε λερώνει και δε βλάπτει τα φυτά που ψεκάζονται. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και μέσω του εδάφους με υδρολίπανση. Η εφαρμογή του σκευάσματος να γίνεται μετά από συμβουλή γεωπόνου.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, αρκεί να μη γίνεται υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων.

ΤΟ ICC ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΕΕ 2018/848 ΚΑΙ 2021/1165

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

- Το ICC εφαρμόζεται προληπτικά ή θεραπευτικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων σε όλες τις καλλιέργειες όπως κηπευτικά, φρούρες, πατάτα, ψχανθή, αροτρίαιες καλλιέργειες, σπαραγγόφυτα, ακρόδρυα, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμπέλια, ελιές, ροδιές, καλλωπιστικά, χλοοτάπητες και άλλες.


ICC	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ*
ΜΙΚΡΕΣ	0,2-0,3L ανά στρέμμα	50-150cc ανά 100L έως 4 εφαρμογές ανά καλλιεργητικό κύκλο
ΜΕΤΡΙΕΣ	0,3-0,4L ανά στρέμμα	
ΜΕΓΑΛΕΣ	0,4-0,8L ανά στρέμμα	

* Ελάχιστη ποσότητα νερού διάλυσης 60L/στρ. στα λαχανικά και 100-150L/στρ. στα σπαραγγόφυτα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Συνδυάζεται με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα θρέψης και φυτοπροστασίας. Θα πρέπει να γίνεται μικρή κλίμακας δοκιμή/ανάμιξη με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο για το ενδεχόμενο σχηματισμού ιζήματος.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΑΛΚΟΥ



1L

ICC[®]
IONIC COPPER CONCENTRATE

Θρέψη - Ενίσχυση της άμυνας των φυτών

Λίπασμα ΕΚ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Υδατοδιαλυτός

Ιοντικός Χαλκός (Cu⁺⁺)

Υδατοδιαλυτό θείο (SO₃)

Β/ο

Β/Β

5,85%

5,04%

9,49%

8,18%

Αντιπρόσωπος

AgroCūre

www.agrocure.com

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Φυλάσσεται στη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες άνω των -4°C, σε κλειστή αποθήκη, προστατευμένη από ακραίες θερμοκρασίες, φωτιά και υγρασία.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΑΔΑ

Παρασκευάζεται στο 80° κλμ. εθνικής οδού Αθηνών- Λαμίας, Ύψατο Βοιωτίας.

Η AGROCURE (τηλ. 2310 797.262 • email: info@agrocure.com) εγγυάται την ποιότητα του προϊόντος, αλλά δεν είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες από μη ενδεδειγμένη χρήση του. Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν τη χρήση του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P102: Μακριά από παιδιά.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα.

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P553: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

Περιέχει: ΘΕΙΙΚΟ ΧΑΛΚΟ

UFI: 3300-ROXR-W008-GDEK



H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.



H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

AGROCURE • ΒΙΠΕ Σίνδου • τ.κ. 57022

τηλ.: 2310 797.262 • email: info@agrocure.com